

Situation des nids et périodes de ponte

<i>espèces</i>	<i>milieux</i>	<i>situation du nid naturel</i>	<i>début reproduc</i>
Aix mandarin	parcs, forêts caduques avec lacs ou rivière	cavité dans un arbre entre 3 et 15m	début avril
Autour des palombes	milieu forestier	dans un arbre, près du tronc en général, à une hauteur de 15 à 25m	avril à mi-juin
Balbuzard pêcheur	régions côtières ou proches d'eaux douces	sur un grand arbre, un pylone, une falaise	avril à début mai
Bergeronnette grise	régions d'élevage, villes et villages, jardins, etc...	cavité près du sol, mur, falaise, arbres, etc... souvent entre 1 et 3m, mais très variable.	fin avril à juin
Bergeronnette des ruisseaux	cours d'eau	cavité dans la rive, racines...	fin avril
Buse variable	régions de plaine avec bois	dans un arbre en général, mais parfois sur une falaise. Hauteur : 8 à 20m.	mars / avril
Canard colvert	proximité des zones humides	au sol, dans la végétation, sur un îlot...	mars en général
Choucas des tours	ouvert avec zones boisées	trou d'arbre, de rocher, de falaise ou de bâtiment. Hauteur très variable	fin avril
Chouette chevêche	vergers, parcs, carrières	trous d'arbres à environ 2,50m du sol, de bâtiments, de falaises...	mi-avril
Chouette chevêchette	forêts de cônifères en montagne	trous d'arbres à des hauteurs de 1 à 15 m.	mars à fin avril
Chouette effraie	ouvert avec zones boisées	trous d'arbres, bâtiments, falaises	avril en général
Chouette hulotte	bois, parcs	trou d'arbre. Hauteur très variable	fin mars
Chouette de Tengmalm	bois de cônifères, en montagne principalement	trous d'arbres, loges de Pics noirs, à des hauteurs allant de 4 à 20 m.	mi-avril à juin
Cigogne blanche	plaines herbeuses ou marécageuses	sur les habitations, les arbres, des poteaux. Hauteur très variable en fonction du site adopté	mi-avril
Cinacle plongeur	cours d'eau	endroits surélevés, face à l'eau. Rive, racines, sous le tablier d'un pont...	fin mars à début juin
Cygne tuberculé	lacs, étangs, mares, fossés	sur un îlot ou dans l'eau peu profonde d'une roselière	mi-avril / mai
Epervier d'Europe	milieu boisé	dans un arbre. Hauteur variable, entre 5 et 10 m.	avril / mai
Faucon crécerelle	ouvert avec zones boisées	dans un arbre, sur une corniche rocheuse, une falaise, un bâtiment, entre 8 et 12 m.	mars
Faucon crécerellette	paysages steppiques secs	colonies. Trou, cavité naturelle, ancien bâtiment, falaise, tas de pierres	fin avril, mi-mai
Faucon hobereau	zones boisées avec plaines	dans un arbre, utilise l'ancien nid d'un corvidé, d'un rapace ou d'un écureuil. Entre 15 et 20 m.	fin mai à juin
Faucon pèlerin	montagnes, côtes rocheuses, certaines villes...	falaise, carrière, parfois bâtiment	fin mars, début avril
Foulque macroule	lacs, étangs avec roselière	sur la berge, dans une phragmitaie, un buisson	avril à juin
Garrot à œil d'or	rives boisées des rivières, des lacs	trou d'arbre, parfois terrier de lapin, souvent entre 3 et 5m.	début avril à mi-juin

Gobemouche gris	bois, parcs, jardins	contre un tronc, dans un mur, à une hauteur de 2 à 4m	mai à mi-juin
Gobemouche noir	bois, parcs, jardins	dans une cavité d'arbre, de mur...	début mai
Grèbe huppé	étangs	nid flottant, près de la rive, dans une roselière, des buissons...	fin avril à juin
Grimpereau des bois	bois, parcs...	derrière un lambeau d'écorce, dans une crevasse de tronc, du lierre, entre 1 et 4m.	avril
Grimpereau des jardins	bois, parcs...	id., entre 2 et 5m de hauteur.	fin mars
Grive musicienne	bois, parcs, jardins	dans un arbuste, généralement à une hauteur de 1 à 2m.	mars à fin mai
Guifette moustac	lacs, étangs	nid flottant.	fin mai, début juin
Guifette noire	étangs, marais, lacs	nid flottant.	mi-mai, début juin
Hibou moyen duc	bois, bosquets	dans un arbre, occupe un ancien nid de corvidé, de rapace, d'écureuil	fin février
Hibou petit duc	parcs, bois, vergers	trou d'arbre, de mur...	fin avril
Hirondelle rustique	villes et villages	intérieur des bâtiments, près du plafond, ponts...	mi-mai à fin avril
Hirondelle de fenêtre	villes et villages	extérieur de bâtiments, sous un avant toit, un porche... (aussi à l'intérieur en région Centre)	fin mai à fin juin
Hirondelle de rivage	près de l'eau en général. Milieux ouverts, carrières	dans une falaise, la paroi d'une carrière. Hauteur variable selon les sites.	mi-mai à juin
Huppe fasciée	ouvert avec zones boisées	trou d'arbre, de bâtiment, à une hauteur maximum de 3m.	fin avril à mi-mai
Martinet noir	villes et villages	sur les bâtiments	fin mai
Martin pêcheur	près de l'eau.	Rive de cours d'eau, d'étang, sablière, talus près de l'eau.	fin avril
Merle noir	bois, villes et villages...	dans un arbre, un bâtiment, une fissure, parfois au sol ou dans une plante grimpante. Hauteur variant de 1 à 10m.	mars à fin avril
Mésange bleue	bois, parcs, jardins, haies.	cavité d'arbre ou de mur à une hauteur de 2 à 4m	mi-avril à début mai
Mésange boréale	bois, parcs, jardins, haies.	trou dans le bois pourri d'un arbre mort (bouleau, aulne, peuplier...)	mi-avril, début juin
Mésange charbonnière	bois, vergers, parcs, haies.	tou d'arbre, de mur, de rocher, à moins de 6m de hauteur.	fin mars à début mai
Mésange huppée	forêts de conifères et mixtes.	cavité pratiquée dans du bois en décomposition	avril à mai
Mésange noire	bois de conifères...	trou d'arbre ou de mur	fin avril à mai
Mésange nonnette	bois de feuillus, vergers, parcs, jardins, haies.	dans une cavité d'arbre, généralement.	mi-avril à début mai
Milan noir	milieu ouvert avec bois, bosquets.	dans un arbre en général, à une hauteur variant de 4,50m à 30m.	mi-avril à mi-mai
Milan royal	milieu ouvert avec bois, bosquets.	dans un arbre, à une hauteur de 6 à 30m.	début mars à avril
Moineau domestique	proche des habitations	sous un toit, trou de mur, etc..., parfois paroi d'une aire de rapace, de cigogne...	avril à août
Moineau friquet	parcs, jardins, bosquets	trou d'arbre, de falaise, de mur, plantes grimpantes...	avril

Moineau soulcie	milieu ouvert ensoleillé, rochers, étendues pierreuses, parfois cultures	crevasse, trou d'arbre, mur, terrier de rongeur...	avril
Pic épeiche	forêts, parcs.	trou pratiqué dans un arbre à une hauteur de 4 à 8m.	mi-avril
Pic épeichette	bois peu denses, vergers, jardins.	trou creusé dans un arbre entre 3 et 6m de hauteur.	début mai
Pic vert	bois, vergers.	trou creusé dans un arbre entre 2 et 6m.	fin avril à mi-mai
Pigeon colombin	forêts, parcs.	trou dans un arbre, une falaise... au dessus de 10m.	mars
Poule d'eau	lacs, étangs, mares, rivières...	sur la rive, dans la végétation.	fin avril à juillet
Rougegorge	bois, vergers, haies, jardins.	souche, tronc, racines, à très faible hauteur, mais aussi jusqu'à 4m.	fin mars à début juin
Rollier d'Europe	Bois clairs	cavité naturelle : arbre, rocher... ancien nid de pic. Hauteur 2 à 7m	mi-mai à juin
Rougequeue à front blanc	bois, parcs, landes, jardins.	trous d'arbres, de bâtiments...	début mai à mi-juin
Rougequeue noir	villes et villages, jardins, falaises.	trou de mur, de falaise, d'arbre creux, entre 2 et 6m de hauteur.	avril
Sittelle torchepot	forêts de feuillus et mixtes, parcs.	trou d'arbre ou de mur entre 2,50m et 6m, généralement.	fin avril à début mai
Sterne naine	rivières, estuaires.	plages, îlots, au sol.	mi-mai à début juin
Sterne pierregarin	côtes, rivières, dunes.	au sol.	fin mai à début juin
Tadorne de Belon	côtes, plages, dunes.	trou dans un talus, une dune, terrier de lapin, arbre creux...	mi-mai à juin
Torcol fourmilier	bois, vergers.	trou d'arbre ou de bâtiment entre 3 et 5m de hauteur.	fin mai
Traquet motteux	pâturages, landes, marais, dunes	trou de carrière, sablière, sous un rocher, dans un terrier de lapin... à une hauteur de 0 à 70cm	fin mars (sud) à juin
Troglodyte	forêts, jardins.	trous à une hauteur variant de 0 à 3,50m.	fin avril